

第6章 点推定法

母集団分布から無作為標本に基づき，母集団分布の未知の母数をひとつの値で推定する方法とその推定精度の評価法について学ぶ．

1 点推定量の性質

1.1 近隣度 (closeness)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ を確率 (密度) 関数 $f_X(x|\theta)$ からの標本の大きさが n のランダム標本とする． $\Theta \subset \mathbb{R}^k$ を θ の母数空間とし，確率 (密度) 関数 $f_X(x|\theta)$ は未知母数 θ のみに依存するものとする． $\tau: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ とし， $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ とおく．

定義 6.1 $t(\mathbf{X})$ と $t'(\mathbf{X})$ を $\tau(\theta)$ の推定量とする． $t'(\mathbf{X})$ が $t(\mathbf{X})$ より集中した $\tau(\theta)$ の推定量であるとは，すべての $\lambda > 0$ に対して

$$\mathbb{P}_\theta[|t'(\mathbf{X}) - \tau(\theta)| \leq \lambda] \geq \mathbb{P}_\theta[|t(\mathbf{X}) - \tau(\theta)| \leq \lambda], \quad \theta \in \Theta$$

を満足することをいう． $t^* = t^*(\mathbf{X}) - \tau(\theta)$ が最も集中しているとは，他のどんな推定量より集中していることをいう．

注意 6.1 t^* は最も望ましい推定量であるが，ほとんどの場合は存在しない．

定義 6.2 (Pitman's closeness) $t'(\mathbf{X})$ が $t(\mathbf{X})$ より Pitman の意味で $\tau(\theta)$ に近い推定量であるとは

$$\mathbb{P}_\theta[|t'(\mathbf{X}) - \tau(\theta)| < |t(\mathbf{X}) - \tau(\theta)|] > \frac{1}{2}, \quad \theta \in \Theta$$

を満足することである．

$t^*(\mathbf{X})$ が Pitman の意味で $\tau(\theta)$ の最近隣推定量であるとは，どんな推定量 $t(\mathbf{X})$ よりも Pitman の意味で $\tau(\theta)$ に近いものをいう．

注意 6.2 これもなかなか存在しない．

1.2 平均 2 乗誤差

定義 6.3 $t(\mathbf{X})$ を $\tau(\theta)$ の推定量とする．推定量 $t(\mathbf{X})$ の平均 2 乗誤差を

$$\mathbb{E}_\theta[(t(\mathbf{X}) - \tau(\theta))^2]$$

で定義する．これを $MSE(\theta, t)$ と記すことにする．

注意 6.3 $\mathbb{E}_\theta$ の θ は考えている標本が分布族の中のどこから来ているかを明示するために用いている．すなわち

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_\theta[(t(\mathbf{X}) - \tau(\theta))^2] \\ = \int \cdots \int [t(x_1, x_2, \dots, x_n) - \tau(\theta)]^2 f(x_1|\theta) f(x_2|\theta) \times \cdots \times f(x_n|\theta) \\ \times dx_1 dx_2 \cdots dx_n \end{aligned}$$

である．

注意 6.4 $t_1(\mathbf{X})$ と $t_2(\mathbf{X})$ の平均 2 乗誤差はともに θ の関数となる．

例 6.1 $\tau(\theta) = \theta$, $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ とする． $\theta_0 \in \Theta$ を固定し，

$$t_{\theta_0}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \theta_0$$

なる推定量 $t_{\theta_0}(\mathbf{X})$ を考える． $t_{\theta_0}(\mathbf{X})$ の平均 2 乗誤差は

$$MSE(\theta, t_{\theta_0}) = \mathbb{E}_\theta[(t_{\theta_0}(\mathbf{X}) - \theta)^2] = \mathbb{E}_\theta[(\theta_0 - \theta)^2] = (\theta_0 - \theta)^2$$

となる．すなわち，

$$MSE(\theta_0, t_{\theta_0}) = 0$$

なる．

いま，すべての推定量 $t(\mathbf{X})$ に対して

$$MSE(\theta, t^*) \leq MSE(\theta, t), \quad \forall \theta \in \Theta$$

を満足するような推定量 $t^*(\mathbf{X})$ が存在するならば，

$$MSE(\theta, t^*) = 0$$

とならなければいけない¹．これは常に θ を正しく推定できることある．したがって， θ がわかっていることと同じである．

¹ $t(\mathbf{X})$ として $t_{\theta_0}(\mathbf{X})$ とすればよい．

θ に関して一様に MSE を最小にする推定量を見つけることができない理由はすべての推定量の集合は大きすぎるからである．したがって，対象とする推定量の集合を小さくしよう．

定義 6.4 推定量 $t(\mathbf{X})$ が $\tau(\theta)$ の不偏推定量であるとは，すべての $\theta \in \Theta$ に対して

$$\mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})] = \tau(\theta)$$

を満足することである．

例 6.2 $t_{\theta_0}(\mathbf{X})$ は θ の不偏推定量ではない．なぜならば， $\theta \neq \theta_0$ のとき

$$\mathbb{E}_\theta[t_{\theta_0}(\mathbf{X})] = \theta_0 \neq \theta$$

からわかる．

定理 6.1 $t(\mathbf{X})$ は $\tau(\theta)$ の推定量とし， $\mathbb{E}_\theta|t(\mathbf{X})|^2 < \infty$ とする．このとき，

$$MSE(\theta, t) = \text{VAR}(t(\mathbf{X})) + \{\mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})] - \tau(\theta)\}^2$$

が成立する．さらに， $t(\mathbf{X})$ が $\tau(\theta)$ の不偏推定量ならば，

$$MSE(\theta, t) = \text{VAR}(t(\mathbf{X}))$$

が成立する．

証明

$$\begin{aligned} MSE(\theta, t) &= \mathbb{E}_\theta[\{t(\mathbf{X}) - \mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})] + \mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})] - \tau(\theta)\}^2] \\ &= \mathbb{E}_\theta[\{t(\mathbf{X}) - \mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})]\}^2] \\ &\quad + 2(\mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})] - \tau(\theta))\mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X}) - \mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})]] \\ &\quad + \{\mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})] - \tau(\theta)\}^2 \\ &= \text{VAR}(t(\mathbf{X})) + \{\mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X})] - \tau(\theta)\}^2 \end{aligned}$$

□

定義 6.5 $BIAS = \mathbb{E}_\theta[t(\mathbf{X}) - \tau(\theta)]$ を推定量 $t(\mathbf{X})$ のバイアスという．

例 6.3 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ を $N(\mu, \sigma^2)$ からのランダム標本とする .

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad U^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

とおく .

$\mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}[\bar{X}_n] = \mu$ より $\bar{X}_n$ は μ の不偏推定量である . また , $\bar{X}_n$ の MSE ($\tau(\mu, \sigma^2) = \mu$) は

$$MSE(\mu, \bar{X}_n) = \mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}[(\bar{X}_n - \mu)^2] = \frac{\sigma^2}{n}$$

である .

一方 ,

$$\mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}[S^2] = \mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - (\bar{X}_n - \mu)^2\right] = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

となり , σ^2 の最尤推定量は σ^2 の不偏推定量ではない . しかし ,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}[U^2] &= \mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - \frac{n}{n-1} (\bar{X}_n - \mu)^2\right] \\ &= \frac{n}{n-1} \sigma^2 - \frac{1}{n-1} \sigma^2 = \sigma^2 \end{aligned}$$

となり , U^2 は σ^2 の不偏推定量である .

例 6.4 $X_1, X_2, \dots, X_n$ をベルヌーイ試行² $\text{Bi}(1, p)$ からのランダム標本とする . ただし , $0 < p < 1$ とする . 標本平均 $\bar{X}_n$ は p の不偏推定量となる . $\tau(p) = p$ として , $\bar{X}_n$ の MSE を求めよう .

$$MSE(p, \bar{X}_n) = \mathbb{E}[(\bar{X}_n - p)^2] = \mathbb{V}\mathbb{A}\mathbb{R}[\bar{X}_n] = \frac{p(1-p)}{n}$$

となる . いま , $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ として ,

$$\hat{p}_B = \frac{Y + \alpha}{\alpha + \beta + n}$$

²すなわち ,

$$\mathbb{P}(X_1 = x) = p^x(1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

なる推定量を考えよう．ただし， α と β は (n に依存する) 定数とする．定理 6.1 を利用して，

$$\begin{aligned}
 MSE(p, \hat{p}_B) &= \text{VAR}[\hat{p}_B] + \{\mathbb{E}[\hat{p}_B] - p\}^2 \\
 &= \text{VAR}\left[\frac{Y + \alpha}{\alpha + \beta + n}\right] + \left[\frac{np + \alpha}{\alpha + \beta + n} - p\right]^2 \\
 &= \frac{1}{(\alpha + \beta + n)^2} \text{VAR}[Y] + \left[\frac{np + \alpha}{\alpha + \beta + n} - p\right]^2 \\
 &= \frac{np(1-p)}{(\alpha + \beta + n)^2} + \left[\frac{np + \alpha}{\alpha + \beta + n} - p\right]^2
 \end{aligned}$$

となる．ここで $\alpha = \beta = \sqrt{n/4}$ とおけば，

$$MSE(p, \hat{p}_B) = \frac{n}{4(\sqrt{n} + n)^2}$$

となる³．

1.3 推定量の一致性

定義 6.6 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ とする． $\tau(\theta)$ の推定量の列 $\{t_n(\mathbf{X})\}_{n=1}^{\infty}$ が平均 2 乗誤差の意味で $\tau(\theta)$ の一致推定量であるとは，すべての $\theta \in \Theta$ に対して，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{\theta}[(t_n(\mathbf{X}) - \tau(\theta))^2] = 0$$

を満足することである．

注意 6.5 推定量 $t_n(\mathbf{X})$ が平均 2 乗誤差の意味で一致性を持てば，定理 6.1 から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}_{\theta}[t_n(\mathbf{X})] = \tau(\theta), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \text{VAR}_{\theta}[t_n(\mathbf{X})] = 0$$

³なぜならば，

$$\begin{aligned}
 MSE(p, \hat{p}_B) &= \frac{np(1-p)}{(\sqrt{n} + n)^2} + \left\{ \frac{np + \sqrt{n/4}}{\sqrt{n} + n} - p \right\}^2 \\
 &= \frac{np(1-p)}{(\sqrt{n} + n)^2} + \left\{ \frac{np + \sqrt{n/4} - p\sqrt{n} - np}{\sqrt{n} + n} \right\}^2 \\
 &= \frac{np(1-p)}{(\sqrt{n} + n)^2} + \frac{n/4 + p^2n - 2\sqrt{n/4} \cdot p\sqrt{n}}{(\sqrt{n} + n)^2} = \frac{n}{4(\sqrt{n} + n)^2}
 \end{aligned}$$

からわかる．

となる．

例 6.5 $X_1, X_2, \dots, X_n$ を平均 μ , 分散 σ^2 の分布からのランダム標本とする．ただし, $\sigma < \infty$ とする． $\{\bar{X}_n\}_{n=1}^\infty$ を μ の推定量の列とすれば,

$$\mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}[\{\bar{X}_n - \mu\}^2] = \mathbb{V}\mathbb{A}\mathbb{R}[\bar{X}_n] = \frac{\sigma^2}{n}$$

よって, $\bar{X}_n$ は平均 2 誤差の意味で一致性を持つ．

定義 6.7 $\tau(\theta)$ の推定量の列 $\{t_n(\mathbf{X})\}_{n=1}^\infty$ が弱一致性を持つとは, どんな正の数 ϵ に対しても

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_\theta[|t_n(\mathbf{X}) - \tau(\theta)| < \epsilon] = 1, \quad \forall \theta \in \Theta$$

が成立することである．簡単に, このような推定量 $t_n(\mathbf{X})$ を弱一致推定量という．

注意 6.6 $t_n(\mathbf{X})$ が平均 2 乗誤差の意味で一致推定量であれば, $t_n(\mathbf{X})$ は弱一致推定量である．なぜならば, Markov の不等式から

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\theta[|t_n(\mathbf{X}) - \tau(\theta)| < \epsilon] &= 1 - \mathbb{P}_\theta[|t_n(\mathbf{X}) - \tau(\theta)| \geq \epsilon] \\ &= 1 - \mathbb{P}_\theta[|t_n(\mathbf{X}) - \tau(\theta)|^2 \geq \epsilon^2] \\ &\geq 1 - \frac{1}{\epsilon^2} \mathbb{E}_\theta[(t_n(\mathbf{X}) - \tau(\theta))^2] \nearrow 1, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

からわかる．

2 最尤法

確率ベクトル $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ の統計モデルを $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^k\}$ とする． $\mathcal{P}$ に含まれる P_θ に対応する確率密度関数もしくは確率関数を $p(\mathbf{x}|\theta)$ と記すことにする．ただし, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ である． $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ が観測されたときの尤度関数を

$$L_n(\theta|\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}|\theta), \quad \theta \in \Theta$$

で定めることにする． $L_n(\cdot|\mathbf{x})$ は標本空間から $\{\theta \mapsto p(\mathbf{x}|\theta) : \mathbf{x} \in S\}$ なる関数族への対応となる． $\mathbf{x}$ があたられたとき, $L_n(\theta|\mathbf{x})$ は θ の関数とみなす．こ

れを簡単に $L_n(\theta)$ と書くことにする． $L_n(\theta)$ は x が与えられたとき，いろいろな θ の「確からしさ」もしくは「尤もらしさ」を表現するものである．

特に， $X_1, X_2, \dots, X_n$ が独立同一に確率密度関数 $f(x|\theta)$ に従うならば，尤度関数は

$$L_n(\theta|x) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$$

で与えられる．

最尤法とは，与えられたデータを実現させるために「尤もらしい」母数の値を母数の推定値として用いる手法である．すなわち， $X = x$ が与えられたとき，尤度関数を最大にする値 $\hat{\theta}(x)$ を見つけることである：

$$L_n(\hat{\theta}(x)|x) = p(x|\hat{\theta}(x)) = \max\{p(x|\theta) : \theta \in \Theta\} = \max\{L_n(\theta|x) : \theta \in \Theta\}$$

$\hat{\theta}(x)$ を θ の最尤推定値といい， $\hat{\theta}(X)$ を θ の最尤推定量という．

例 6.6 確率変数 X が正規分布 $N(\theta, \sigma^2)$ に従うとする．ただし， σ^2 は既知とする．このとき，尤度関数は

$$L_1(\theta|x) = \frac{1}{\sigma} \psi\left(\frac{x-\theta}{\sigma}\right)$$

となる．ただし， $\psi(x) = (1/\sqrt{2\pi})e^{-x^2/2}$ である．このとき，最大は

$$\hat{\theta}(x) = x$$

のとき唯一達成される．したがって， $\hat{\theta}(X) = X$ は最尤推定量となる．

つぎに， $X_1, X_2, \dots, X_n$ は独立同一に正規分布 $N(\theta, \sigma^2)$ に従うとする．ここでも σ^2 は既知とする．このとき，尤度関数は

$$\begin{aligned} L_n(\theta|x) &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta)^2}{\sigma^2}\right] \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \exp\left[-\frac{1}{2}\frac{(\bar{x}_n - \theta)^2}{\sigma^2/n}\right] \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x}_n)^2}{\sigma^2}\right] \end{aligned}$$

となる．よって，最大は

$$\hat{\theta}(x) = \bar{x}_n, \quad \bar{x}_n = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

で達成される．したがって，最尤推定量は $\hat{\theta}(X) = \bar{X}_n$ となる．ただし， $\bar{X}_n = (1/n)(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ である．

尤度関数に対数をとったものを対数尤度とよび，

$$l_n(\theta) = \log L_n(\theta | \mathbf{x})$$

と記す⁴．特に， $X_i, i = 1, 2, \dots, n$ ，が独立同一に確率密度関数 $f(x|\theta)$ に従う場合には

$$l_n(\theta) = \log \Pi_{i=1}^n f(x_i | \theta) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i | \theta)$$

となる．

もし， θ が開集合で $l_n(\theta)$ が θ に関して微分可能で $\hat{\theta}(\mathbf{x})$ が存在するならば， $\hat{\theta}(\mathbf{x})$ は方程式

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} l_n(\theta) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

をみたす．この方程式を尤度方程式という．

例 6.7 標識 1, 2, 3 のどれかをもつ個体から構成される母集団を考える．それぞれの標識の出現確率は Hardy-Weinberg 比率で与えられるとする：

$$p(1|\theta) = \theta^2, \quad p(2|\theta) = 2\theta(1-\theta), \quad p(3|\theta) = (1-\theta)^2, \quad 0 < \theta < 1$$

たとえば，3 つの個体を観測し， $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ を得たとする．このとき

$$L_3(\theta | \mathbf{x}) = p(1|\theta)p(2|\theta)p(1|\theta) = 2\theta^5(1-\theta)$$

となる．尤度方程式は

$$\frac{\partial}{\partial \theta} l_3(\theta) = \frac{5}{\theta} - \frac{1}{1-\theta} = 0$$

となり，唯一の解 $\hat{\theta} = 5/6$ を得る．これは

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} l_3(\theta) = -\frac{5}{\theta^2} - \frac{1}{(1-\theta)^2} < 0, \quad 0 < \theta < 1$$

よりわかる．

一般に， n 個の観測 $x_1, x_2, \dots, x_n$ を得たとする．いま

$$n_j = \#\{x_i = j : i = 1, 2, \dots, n\}, \quad j = 1, 2, 3$$

⁴形式的に， $0/0 = 0, 0 \times \infty = 0$ とする．

とする．尤度関数は

$$L_n(\theta|x) = \theta^{2n_1} \{2\theta(1-\theta)\}^{n_2} (1-\theta)^{2n_3} = 2^{n_2} \theta^{2n_1+n_2} (1-\theta)^{n_2+2n_3}$$

より

$$\frac{\partial}{\partial \theta} l_n(\theta) = \frac{2n_1+n_2}{\theta} - \frac{n_2+2n_3}{1-\theta} = \frac{1}{\theta(1-\theta)} \{(2n_1+n_2) - 2(n_1+n_2+n_3)\theta\}$$

より, $2n_1+n_2 > 0$, $n_2+2n_3 > 0$ のとき, 最尤推定値は唯一存在して,

$$\hat{\theta}(x) = \frac{2n_1+n_2}{2(n_1+n_2+n_3)}$$

となる．もし, $2n_1+n_2 = 0$ のとき, 尤度関数は

$$2^{n_2} (1-\theta)^{(2n_1+n_2)+(n_2+2n_3)} = 2^{n_2} (1-\theta)^{n_2+2n_3}$$

となり, $\theta = 0$ のとき, 尤度関数は最大になり, $\Theta = (0, 1)$ なので, 最尤推定値は存在しない．また, $n_2+2n_3 = 0$ のときは, 尤度関数は $2^{n_2} \theta^{2n_1+n_2}$ なり, 最尤推定値は存在しない．

例 6.8 $X_1, X_2, \dots, X_n$ は独立同一分布に従い, 各 $X_i, i = 1, 2, \dots, n$, は $1, 2, \dots, k$ の値をとり, その確率は $\theta_j = \mathbb{P}\{X_i = j\}, j = 1, 2, \dots, k$, で与えられるとする．ここで, $n \geq k-1$ を仮定する．いま, $N_j = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{X_i = j\}$ おく． $X = x$ が与えられたとする．このとき, $n_j = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{x_i = j\}$ とおけば, 対数尤度は

$$l_n(\theta) = \log L_n(\theta|x) = \log p(x|\theta) = \sum_{j=1}^k n_j \log \theta_j$$

となる．ただし, $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$ で

$$\theta_k = 1 - \sum_{j=1}^{k-1} \theta_j \quad (6.1)$$

である．

まず, $n_j > 0, j = 1, 2, \dots, k$, を仮定する．このとき, θ_j のどれかがゼロならば, $p(x|\theta) = 0$ となる．したがって, 最尤推定値は $\theta_j > 0$ となるので, 上

の仮定のもとでは，最尤推定値は $[0, 1]^k$ の内点である．したがって，最尤推定値は尤度方程式

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} l_n(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta_j} \sum_{\ell=1}^k n_\ell \log \theta_\ell = \sum_{\ell=1}^k \frac{n_\ell}{\theta_\ell} \frac{\partial \theta_\ell}{\partial \theta_j} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k-1$$

となる．(6.1) から $\partial \theta_k / \partial \theta_j = -1$, $j = 1, 2, \dots, k-1$, となる．よって，尤度方程式は

$$\frac{\hat{\theta}_k}{\hat{\theta}_j} = \frac{n_k}{n_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k-1$$

となる．これを再度 (6.1) に代入すれば， $\hat{\theta}_k = n_k/n$ となり，

$$\hat{\theta}_j = \frac{n_j}{n}, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

となる．ただし， $n = \sum_{\ell=1}^k n_\ell$ とした．つぎに， $\theta_j = n_j/n$, $j = 1, 2, \dots, k$ が実際に $l_n(\theta)$ を最大にしていることを確認するために， $l_n(\theta)$ は $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{k-1})$ に関して concave であることを示す． $1 \leq r \leq k-1$, $1 \leq j \leq k-1$ に対して，

$$\frac{\partial}{\partial \theta_r} \frac{\partial}{\partial \theta_j} l_n(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta_r} \left(\frac{n_j}{\theta_j} - \frac{n_k}{\theta_k} \right) = \begin{cases} -\left(\frac{n_r}{\theta_r^2} + \frac{n_k}{\theta_k^2} \right) < 0, & r = j \\ -\frac{n_k}{\theta_k^2} < 0, & r \neq j \end{cases}$$

となる．

ある j に対して， $n_j = 0$ のとき， $\hat{\theta}_j = n_j/n$ が最尤推定値であることも確認することができる．

定理 6.2 $T(X)$ を未知母数 θ の十分統計量とする．このとき， θ の最尤推定量が一意に存在するならば， θ の最尤推定量は T の関数である．

証明 $p(x|\theta)$ を確率関数または確率密度関数とする．因子分解定理から θ と T を通してのみ x に依存する関数 g と x のみに依存する関数 h が存在して，

$$p(x|\theta) = h(x)g(T(x)|\theta)$$

と書ける．これより θ に関して $p(x|\theta)$ を最大化することは θ に関して $g(T(x)|\theta)$ を最大化することと同値になる．また， $T(x) = t$ と与えられたとき， $g(t|\theta)$ が 2 つ以上 θ で最大になるとすれば，それに対応する x において $g(T(x)|\theta)$ も

2 つ以上の θ で最大化されるので、仮定と矛盾する．したがって、 $g(t|\theta)$ を θ について最大にする点はひとつである． $\square$

定理 6.3 関数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が 1 対 1 のとき、 $\hat{\theta}$ が θ の最尤推定量であれば、 $g(\hat{\theta})$ は $g(\theta)$ の最尤推定量である．

証明 g は 1 対 1 だから、逆関数 g^{-1} が存在し、 $\tau = g(\theta)$ のとき、 $\theta = g^{-1}(\tau)$ となる．これより

$$L_n(\theta|\mathbf{x}) = p(\mathbf{x}|\theta) = p(\mathbf{x}|g^{-1}(\tau)) = \tilde{L}_n(\tau|\mathbf{x})$$

と書けるので、

$$\sup_{\tau} \tilde{L}_n(\tau|\mathbf{x}) = \sup_{\tau} L_n(g^{-1}(\tau)|\mathbf{x}) = \sup_{\theta} L_n(\theta|\mathbf{x})$$

よって、 $\hat{\theta} = g^{-1}(\hat{\tau})$ のとき最大化される．したがって、 $\hat{\tau} = g(\hat{\theta})$ のとき最大化される． $\square$

例 6.9 (指数分布族の最尤推定量) $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ は k 母数指数分布族

$$f(x|\boldsymbol{\eta}) = S(x) \exp\left[\sum_{j=1}^k \eta_j T_j(x) - A(\boldsymbol{\eta})\right]$$

からの大きさ n のランダム標本とする．ただし、 $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k)$ とし、自然母数空間 $\boldsymbol{\eta} \in \mathcal{E}$ は $\mathbb{R}^k$ の開集合とする．である．このとき、 $\mathbf{X}$ の同時確率(密度)関数は

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}|\boldsymbol{\eta}) &= \prod_{i=1}^n f(x_i|\boldsymbol{\eta}) \\ &= \prod_{i=1}^n S(x_i) \exp\left[\sum_{j=1}^k n\eta_j \bar{T}_j(\mathbf{x}) - nA(\boldsymbol{\eta})\right] \end{aligned}$$

となる．ただし、 $\bar{T}_j(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n T_j(x_i)$, $j = 1, 2, \dots, k$ である．したがって、対数尤度は

$$l_n(\boldsymbol{\eta}) = n \sum_{j=1}^k \eta_j \bar{T}_j(\mathbf{x}) - nA(\boldsymbol{\eta}) + (\text{定数項})$$

となる．系 ?? を用いれば，

$$\frac{\partial}{\partial \eta_j} l_n(\boldsymbol{\eta}) = n\bar{T}_j(\boldsymbol{x}) - n \frac{\partial}{\partial \eta_j} A(\boldsymbol{\eta}) = n\bar{T}_j(\boldsymbol{x}) - n\mathbb{E}_{\boldsymbol{\eta}}[T_j(X)]$$

と

$$\frac{\partial^2}{\partial \eta_j \partial \eta_m} l_n(\boldsymbol{\eta}) = -n \frac{\partial^2}{\partial \eta_j \partial \eta_m} A(\boldsymbol{\eta}) = -n \mathbb{Cov}_{\boldsymbol{\eta}}(T_j(X), T_m(X))$$

となるので，行列 $((\partial^2/\partial \eta'_j \eta)A(\boldsymbol{\eta}))$ は負の定符号となる．したがって，尤度方程式

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_j(x_i) = \frac{\partial}{\partial \eta_j} A(\boldsymbol{\eta})$$

または

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_j(x_i) = \mathbb{E}_{\boldsymbol{\eta}}[T_j(X)], \quad j = 1, 2, \dots, k$$

は唯一の解を持ち，これは $\boldsymbol{\eta}$ の最尤推定値となる．

3 不偏推定と Cramér-Rao の定理

この節では，簡単のために， $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ とする． $X_1, X_2, \dots, X_n$ を確率（密度）関数 $f(x|\theta)$ からのランダム標本とし，標本 $\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ に基づく $\tau(\theta)$ の推定量を $T = T(\boldsymbol{X})$ とする． T の平均自乗誤差 (MSE) は

$$\mathbb{E}_{\theta}[\{T(\boldsymbol{X}) - \tau(\theta)\}^2] = \text{VAR}_{\theta}[T(\boldsymbol{X})] + \{\mathbb{E}_{\theta}[T(\boldsymbol{X})] - \tau(\theta)\}^2$$

と書けた．さらに， T が $\tau(\theta)$ の不偏推定量であれば，

$$\mathbb{E}_{\theta}[\{T(\boldsymbol{X}) - \tau(\theta)\}^2] = \text{VAR}_{\theta}[T(\boldsymbol{X})]$$

となる．

定義 6.8 (一様最小分散不偏推定量 Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator) $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ とする． $X_1, X_2, \dots, X_n$ を確率（密度）関数 $f(x|\theta)$ からのランダム標本とし， $\tau(\theta)$ の推定量 $T^* = T^*(\boldsymbol{X})$ が $\tau(\theta)$ の一様最小分散不偏推定量（略して UMVUE）であるとはつぎを満足することである：

- (i) $\mathbb{E}_{\theta}[T^*] = \tau(\theta)$ (すべての $\theta \in \Theta$)
- (ii) すべての $\theta \in \Theta$ に対して， $\tau(\theta)$ の任意の不偏推定量 $T = T(\boldsymbol{X})$ に対し

$$\text{VAR}_{\theta}[T^*] \leq \text{VAR}_{\theta}[T], \quad (\text{すべての } \theta \in \Theta)$$

3.1 不偏推定量の分散の下限

この節では、各 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ は連続型分布とし、確率密度関数 $f(x|\theta)$ を持つものとして議論を進める。各 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ が離散型分布の場合には、積分を和の記号に置き換えればよい。

定理 6.4 $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ とする。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ を確率密度関数 $f(x|\theta)$ からのランダム標本とし、以下の仮定をおく：

- (A1) 集合 $\{x : f(x|\theta) > 0\}$ は θ に依存しない。
- (A2) すべての x と θ に対し、 $(d/d\theta)f(x|\theta)$ は存在する。
- (A3) $\mathbb{E}_\theta[|T(\mathbf{X})|] < \infty$ なる推定量 T に対し

$$\begin{aligned} & \frac{d}{d\theta} \int \cdots \int T(x_1, x_2, \dots, x_n) \Pi_{i=1}^n f(x_i|\theta) dx_i \\ &= \int \cdots \int T(x_1, x_2, \dots, x_n) \frac{d}{d\theta} \Pi_{i=1}^n f(x_i|\theta) dx_i. \end{aligned}$$

- (A4) すべての $\theta \in \Theta$ に対し

$$0 < \mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{d}{d\theta} \log f(X_1|\theta) \right\}^2 \right] < \infty.$$

- (A5) $\tau(\theta)$ は微分可能で $\tau(\theta) = \mathbb{E}_\theta[T(\mathbf{X})]$ で、 $\tau(\theta) = \mathbb{E}_\theta[T(\mathbf{X})]$.

このとき、 θ に関して一様に

$$\text{VAR}_\theta[T] \geq \frac{[\tau'(\theta)]^2}{n \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log f(X_1|\theta) \right)^2 \right]}.$$

が成立する。また、等号成立は

$$\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) = K(\theta, n)[T(\mathbf{X}) - \tau(\theta)] \quad (6.2)$$

のときに限る。

証明 $f(\mathbf{x}|\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)$ と $d\mathbf{x} = dx_1 dx_2 \cdots dx_n$ 記すことにする.

$$\begin{aligned}
 \tau'(\theta) &= \frac{d}{d\theta} \int \cdots \int T(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} \\
 &= \int \cdots \int T(\mathbf{x}) \frac{d}{d\theta} f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} - \tau(\theta) \frac{d}{d\theta} \int \cdots \int f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} \\
 &= \int \cdots \int [T(\mathbf{x}) - \tau(\theta)] \frac{d}{d\theta} f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} \\
 &= \int \cdots \int [T(\mathbf{x}) - \tau(\theta)] \left(\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{x}|\theta) \right) f(\mathbf{x}|\theta) d\mathbf{x} \\
 &= \mathbb{E}_\theta \left[\{T(\mathbf{X}) - \tau(\theta)\} \left(\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right) \right]
 \end{aligned}$$

となる. Cauchy-Schwarz の不等式から

$$[\tau'(\theta)]^2 \leq \mathbb{E}_\theta[\{T(\mathbf{X}) - \tau(\theta)\}^2] \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right)^2 \right]$$

よって

$$\text{VAR}_\theta[T] \geq \frac{[\tau'(\theta)]^2}{\mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right)^2 \right]}.$$

しかし

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right)^2 \right] &= \mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \sum_{i=1}^n \frac{d}{d\theta} \log f(X_i|\theta) \right\}^2 \right] \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbb{E}_\theta \left[\frac{d}{d\theta} \log f(X_i|\theta) \frac{d}{d\theta} \log f(X_j|\theta) \right] \\
 &= n \mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{d}{d\theta} \log f(X_1|\theta) \right\}^2 \right].
 \end{aligned}$$

なぜならば, $i \neq j$ のとき X_i と X_j は独立であることと

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}_\theta \left[\frac{d}{d\theta} \log f(X_1|\theta) \right] &= \int \left(\frac{d}{d\theta} \log f(x|\theta) \right) f(x|\theta) dx = \int \frac{d}{d\theta} f(x|\theta) dx \\
 &= \frac{d}{d\theta} \int f(x|\theta) dx = 0
 \end{aligned}$$

最後に Cauchy-Schwarz の不等式の等号成立条件から

$$\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) = K(\theta, n)[t(\mathbf{X}) - \tau(\theta)] + b(\theta) \quad (6.3)$$

が等号成立条件となることがわかる．しかし，両辺の期待値をとれば，

$$0 = \mathbb{E}_\theta \left[\frac{d}{d\theta} \log f(\mathbf{X}|\theta) \right] = K(\theta, n) \mathbb{E}_\theta [t(\mathbf{X}) - \tau(\theta)] + b(\theta) = b(\theta)$$

となるので， $b(\theta) = 0$ がわかる．よって，等号成立条件は (6.2) であることが示せた． $\square$

注意 6.7 T が $\tau(\theta)$ の一様最小分散不偏推定量ならば，一意である．これは以下の議論からわかる． T' を別の $\tau(\theta)$ の一様最小分散不偏推定量とし， $T^* = (1/2)(T + T')$ とおく．すると， $\mathbb{E}[T^*] = \tau(\theta)$ となり， T^* も $\tau(\theta)$ の不偏推定量となる．したがって，すべての θ に対して，

$$\text{VAR}_\theta(T^*) \geq \text{VAR}_\theta(T) \quad (6.4)$$

となる．しかし，

$$\begin{aligned} \text{VAR}_\theta(T^*) &= \text{VAR}_\theta((1/2)T + (1/2)T') \\ &= \frac{1}{4}\text{VAR}_\theta(T) + \frac{1}{4}\text{VAR}_\theta(T') + \frac{1}{2}\text{COV}_\theta(T, T') \\ &\leq \frac{1}{4}\text{VAR}_\theta(T) + \frac{1}{4}\text{VAR}_\theta(T') + \frac{1}{2}\sqrt{\text{VAR}_\theta(T)}\sqrt{\text{VAR}_\theta(T')} \\ &= \text{VAR}_\theta(T) \end{aligned} \quad (6.5)$$

となる．不等号は Cauchy-Schwarz の不等式からわかる．また，最後の等号は $\text{VAR}_\theta(T) = \text{VAR}_\theta(T')$ よりわかる．(6.4) と (6.5) から

$$\text{VAR}_\theta(T) = \text{VAR}_\theta(T^*) \quad (6.6)$$

が成立することがわかる．したがって，(6.5) の Cauchy-Schwarz の不等式は等号が成立している．Cauchy-Schwarz の不等式の等号成立条件から，ある定数 $a(\theta)$ と $b(\theta)$ が存在して

$$T' = a(\theta)T + b(\theta)$$

と書ける．しかし， $\text{VAR}_\theta(T') = \{a(\theta)\}^2 \text{VAR}_\theta(T)$ と (6.6) から $a(\theta) = 1$ となる⁵．さらに，

$$\tau(\theta) = \mathbb{E}_\theta(T') = \mathbb{E}_\theta(T) + b(\theta) = \tau(\theta) + b(\theta)$$

から $b(\theta) = 0$ となる．したがって， $T = T'$ となることがわかる．

例 6.10 $X_1, X_2, \dots, X_n$ を指数分布 $f(x|\theta) = \theta e^{-\theta x} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(x)$ からの大きさ n のランダム標本とする．ただし， $\theta > 0$ である．

まず， $\tau(\theta) = \theta$ とする． θ の推定量 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ の Cramér-Rao の下限は

$$\text{VAR}_\theta(T) \geq \frac{1}{n \mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{d}{d\theta} \log f(X_1|\theta) \right\}^2 \right]}$$

となる．さらに，

$$\frac{d}{d\theta} \log f(x|\theta) = \frac{1}{\theta} - x$$

より

$$\mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{d}{d\theta} \log f(X_1|\theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{1}{\theta} - X_1 \right\}^2 \right] = \text{VAR}(X_1) = \frac{1}{\theta^2}$$

となる⁶．したがって，

$$\text{VAR}_\theta[T] \geq \frac{1}{n(1/\theta^2)} = \frac{\theta^2}{n}$$

となる．

つぎに， $\tau(\theta) = 1/\theta$ とする． $\tau(\theta)$ の推定量 $S = S(X_1, X_2, \dots, X_n)$ の Cramér - Rao の下限は

$$\text{VAR}_\theta(S) \geq \frac{\{\tau'(\theta)\}^2}{n(1/\theta^2)} = \frac{1}{n\theta^2}$$

⁵ $\text{COV}_\theta[T, T'] = \text{VAR}_\theta[T]$ なので， $\text{COV}_\theta[T, T'] > 0$ となるので， $a(\theta) = 1$ となる．

⁶

$$\mathbb{E}(X_1) = \theta \int_0^\infty x \theta e^{-\theta x} dx = (1/\theta) \int_0^\infty y e^{-y} dy = (1/\theta) \Gamma(2) = (1/\theta)$$

と

$$\mathbb{E}(X_1^2) = (1/\theta^2) \int_0^\infty y^2 e^{-y} dy = (1/\theta^2) \Gamma(3) = (1/\theta^2) 2!$$

からわかる．

となる．さらに，

$$\sum_{i=1}^n \frac{d}{d\theta} \log f(X_i | \theta) = \sum_{i=1}^n \frac{d}{d\theta} (\log \theta - \theta X_i) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\theta} - X_i \right) = -n \left(\bar{X}_n - \frac{1}{\theta} \right)$$

より，(6.2) において $K(\theta, n) = -n$ とおけば， $S = \bar{X}_n$ は $1/\theta$ の UMVUE となる．

例 6.11 $X_1, X_2, \dots, X_n$ をポアソン分布 $f(x | \theta) = e^{-\theta} \theta^x / x! (x = 0, 1, \dots)$ からの大きさ n のランダム標本とする．ただし， $\theta > 0$ である．

$\tau(\theta) = e^{-\theta} = \mathbb{P}[X_1 = 0]$ とする．

$$\frac{d}{d\theta} \log f(x | \theta) = -1 + \frac{x}{\theta}$$

に注意すれば，

$$\mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_1 | \theta) \right\}^2 \right] = \mathbb{E}_\theta \left[\left\{ \frac{X_1}{\theta} - 1 \right\}^2 \right] = \frac{1}{\theta^2} \mathbb{E}_\theta [(X_1 - \theta)^2] = \frac{1}{\theta}$$

となる⁷．よって， $\tau(\theta)$ の推定量推定量 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ の Cramér-Rao の下限は

$$\text{VAR}_\theta(T) \geq \frac{(-e^{-\theta})^2}{n(1/\theta)} = \frac{\theta e^{-2\theta}}{n}$$

となる．

いま， $\tau(\theta)$ の推定量推定量

$$T_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{X_i = 0\}$$

を考える．

$$\mathbb{E}_\theta[T_0] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_\theta[\mathbb{1}\{X_i = 0\}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [1 \cdot \mathbb{P}_\theta(X_i = 0) + 0 \cdot \mathbb{P}_\theta(X_i \neq 0)] = e^{-\theta}$$

⁷ポアソン分布の平均と分散は θ になることからわかる．

となる．したがって， T_0 は $\tau(\theta) = e^{-\theta}$ の不偏推定量となる．また，

$$\begin{aligned}\mathrm{VAR}_{\theta}[T_0] &= \mathbb{E}_{\theta} \left[\left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{X_i = 0\} \right\}^2 \right] - \{\mathbb{E}_{\theta}(T_0)\}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{\theta} \left[\frac{1}{n^2} \mathbb{1}\{X_i = 0\} \right] + \sum_{i \neq j} \mathbb{E}_{\theta} \left[\frac{1}{n^2} \mathbb{1}\{X_i = 0\} \mathbb{1}\{X_j = 0\} \right] - e^{-2\theta} \\ &= \frac{1}{n} e^{-\theta} + \frac{n(n-1)}{n^2} e^{-2\theta} - e^{-2\theta} = \frac{1}{n} e^{-\theta} (1 - e^{-\theta})\end{aligned}$$

となる． $\theta > 0$ に対し

$$\frac{1}{n} e^{-\theta} (1 - e^{-\theta}) \geq \frac{1}{n} \theta e^{-2\theta}$$

である⁸．

つぎに， $\tau(\theta) = \theta$ とおく．

$$\sum_{i=1}^n \frac{d}{d\theta} \log f(X_i | \theta) = \sum_{i=1}^n \left(-1 + \frac{X_i}{\theta} \right) = \frac{n}{\theta} (\bar{X}_n - \theta)$$

となり，(6.2) において $K(\theta, n) = n/\theta$ とおけば， $\bar{X}_n$ は $\tau(\theta) = \theta$ の UMVUE となることがわかる．

4 十分性と完備性

定理 6.5 (Rao-Blackwell) $X_1, X_2, \dots, X_n$ を確率 (密度) 関数 $f(x|\theta)$, $\theta \in \Theta$ からの大きさ n ($n \geq 2$) のランダム標本とし， $S_i = S_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $i = 1, 2, \dots, k$ を十分統計量とする． $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ を $\tau(\theta)$ の不偏推定量で $\mathrm{VAR}(T) < \infty$ なるものとする．推定量 $T' = T'(X_1, X_2, \dots, X_n)$ を $T' = \mathbb{E}[T | S_1, \dots, S_k]$ で定義する．このとき，

- (i) T' は統計量で $S_1, \dots, S_k$ を通してのみ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ に依存する．したがって， $T' = T'(S_1, \dots, S_k)$ を記すことにする．
- (ii) $\mathbb{E}_{\theta}[T'] = \tau(\theta)$ となる．すなわち， T' は $\tau(\theta)$ の不偏推定量である．
- (iii) すべての $\theta \in \Theta$ に対し

$$\mathrm{VAR}(T') \leq \mathrm{VAR}(T)$$

⁸これは $e^{-\theta}(1 - e^{-\theta}) - \theta e^{-2\theta} = e^{-\theta}[1 - e^{-\theta} - \theta e^{-\theta}]$ となるので， $f(\theta) = 1 - e^{-\theta} - \theta e^{-\theta}$ として評価すれば， $f(\theta) \geq 0$ となることよりわかる．

の UMVUE となる． T^* がどのような推定量になるかを計算しよう．

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\{X_1 = 0 \mid \sum_{i=1}^n X_i = s\} &= \frac{\mathbb{P}\{X_1 = 0 \text{ かつ } \sum_{i=1}^n X_i = s\}}{\mathbb{P}\{\sum_{i=1}^n X_i = s\}} \\
 &= \frac{\mathbb{P}\{X_1 = 0 \text{ かつ } \sum_{i=2}^n X_i = s\}}{\mathbb{P}\{\sum_{i=1}^n X_i = s\}} \\
 &= \frac{\mathbb{P}\{X_1 = 0\} \mathbb{P}\{\sum_{i=2}^n X_i = s\}}{\mathbb{P}\{\sum_{i=1}^n X_i = s\}} \\
 &= \frac{e^{-\theta} e^{-(n-1)\theta} [(n-1)\theta]^s / s!}{e^{-n\theta} [n\theta]^s / s!} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^s
 \end{aligned}$$

となる．したがって

$$\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\{0\}}(X_1) \mid \sum_{i=1}^n X_i = s] = \mathbb{P}\{X_1 = 0 \mid \sum_{i=1}^n X_i = s\} = \left(\frac{n-1}{n}\right)^s$$

となる．故に

$$T^* = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{\sum_{i=1}^n X_i}$$

は $\tau(\theta) = e^{-\theta}$ の UMVUE である．

5 ベイズ推定量

6 演習問題

問題 6.1 $X_1, X_2, \dots, X_m$ を正規分布 $N(\theta, \sigma^2)$ からの標本の大きさが m のランダム標本とし， $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ を正規分布 $N(\theta, \tau^2)$ からの標本の大きさが n のランダム標本とする．ここで， $X_1, X_2, \dots, X_m$ と $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ は互いに独立する．また， σ^2 と τ^2 は既知とする．定数 a ($0 \leq a \leq 1$) に対して，

$$\hat{\theta}_a = a\bar{X}_m + (1-a)\bar{Y}_n,$$

とする．ただし， $\bar{X}_m = (1/m) \sum_{i=1}^m X_i$ と $\bar{Y}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n Y_i$ である．

(1) $\hat{\theta}_a$ は θ の不偏推定量であることを示せ．

(2) $\hat{\theta}_a$ の MSE を求め， $\hat{\theta}_a$ の MSE を最小にする a は

$$a = \frac{\tau^2}{n} \bigg/ \left(\frac{\sigma^2}{m} + \frac{\tau^2}{n} \right)$$

となることを示せ．

問題 6.2 $X_1, X_2, \dots, X_m$ と $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ をそれぞれ平均 μ_1 , 分散 σ^2 の正規分布と平均 μ_2 , 分散 σ^2 の正規分布からのランダム標本とする. ここで, $X_1, X_2, \dots, X_m$ と $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ は独立であるとする.

- (1) μ_1, μ_2, σ^2 の対数尤度関数から μ_1, μ_2, σ^2 の最尤推定量は以下で与えられることを示せ.

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X}, \quad \hat{\mu}_2 = \bar{Y}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m+n} \left\{ \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2 \right\}.$$

- (2) 最尤推定量のバイアスを求めよ. さらに, σ^2 の推定量

$$c \left\{ \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2 \right\}.$$

が不偏推定になるように定数 c を定めよ.

問題 6.3 $X_1, X_2, \dots, X_n$ を確率密度関数

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\sigma} \exp\{-(x - \mu)/\sigma\} \mathbb{1}_{(\mu, \infty)}(x)$$

をもつ分布からのランダム標本とする. ただし, $-\infty < \mu < \infty, \sigma > 0$ である.

- (1) $\mathbb{E}(X - \mu)$ と $\text{VAR}(X)$ を求めよ.
 (2) μ は既知として, σ^2 の最尤推定量が $(\bar{X} - \mu)^2$ で与えられることを示せ. ただし, $\bar{X} = \sum X_i/n$ である.
 (3) 最尤推定量 $(\bar{X} - \mu)^2$ のバイアスを計算せよ (ヒント: $\sum (X_i - \mu)$ は母数 n, σ^{-1} のガンマ分布に従うことに注意せよ.)
 (4)

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

は σ^2 の不偏推定量になることを示せ.

- (5) μ は既知とし, $\mathbb{P}[X_1 > t] (t > \mu)$ の最尤推定量を求めよ. (ヒント: 確率を σ と t で表し, それが σ の 1 対 1 の関数になっていることを利用せよ.)

問題 6.4 確率変数 X は次のような確率関数 $f(x|\theta)$ を持つとする.

X	-2	-1	0	1	2	計
$f(x \theta)$	$\frac{\theta}{6}$	$\frac{\theta}{3}$	$1 - \theta$	$\frac{\theta}{3}$	$\frac{\theta}{6}$	1

ただし, $0 < \theta < 1$ である. 統計量

$$S = S(X) = |X|, \quad T = T(X) = \frac{3}{4}S$$

を考える.

- (1) S の確率分布を求めよ.
 (2) S の確率分布および S が与えられたときの X の条件付確率分布を求め, S は θ の十分統計量かどうかを調べよ.

- (3) θ の推定量 T の $\text{MSE}(T, \theta)$ (平均 2 乗誤差) を求めよ. (横軸を θ とし, 縦軸を $\text{MSE}(T, \theta)$ の値として, $\text{MSE}(T, \theta)$ のグラフに描くこと)

問題 6.5

$X_1, X_2, \dots, X_n$ は確率密度関数

$$f(x|\theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < \theta < \infty \quad (6.7)$$

からの大きさ n のランダム標本とする.

- (1) $X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n$ を観測したのときの尤度関数を述べよ.
 (2) θ の最尤推定量を求めよ. さらに, $\tau = \theta^{-1}$ の最尤推定量は

$$\hat{\tau}_n = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log X_i$$

で与えられることを示せ.

- (3) 確率変数 X が確率密度関数 (6.7) を持つ分布に従うとき, X と $T = -\theta \log X$ の分布関数を求めよ. さらに, T の積率母関数 $M_T(r)$ を求めよ.
 (4) $\hat{\tau}_n$ は τ の不偏推定量であることを示した上でその分散を求めよ.
 (5) $\hat{\tau}_n$ は τ の一様最小分散不偏推定量であることを示せ.
 (6) ピボット $-\theta \sum_{i=1}^n \log X_i$ を利用して, 信頼係数 $\alpha \times 100\%$ の θ の信頼区間を構成せよ. ただし, $0 < \alpha < 1$ である.

ヒント

- 適当な正則条件のもとで $g(\theta)$ の不偏推定量 U (標本の大きさが n のランダム標本に基づく推定量) の分散の下限が

$$\text{VAR}_\theta[U] \geq \frac{\left(\frac{\partial g}{\partial \theta}(\theta)\right)^2}{n\text{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_1|\theta)\right)^2\right]}$$

で与えられる.

- 母数 $(n, 1)$ のガンマ分布の確率密度関数と積率母関数は

$$f(x|n, 1) = \frac{1}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-x} I_{(0, \infty)}(x) \quad \text{と} \quad M_X(r) = \left(\frac{1}{1-r}\right)^n, \quad (r < 1)$$

で与えられる.

- $u_{\alpha/2}$ と $l_{\alpha/2}$ を母数 $(n, 1)$ のガンマ分布の上側 $(\alpha/2) \times 100\%$ 点と上側 $(1-\alpha/2) \times 100\%$ とする. すなわち,

$$\int_{u_{\alpha/2}}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-x} dx = \frac{\alpha}{2}, \quad \text{と} \quad \int_0^{l_{\alpha/2}} \frac{1}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-x} dx = \frac{\alpha}{2}$$

とする.

問題 6.6

$X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ をポアソン分布

$$f_X(x|\lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0$$

からの大きさ n のランダム標本とする.

- (1) $\bar{X}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n X_i$ としたとき, $\bar{X}_n$ は λ の不偏推定量であることを示せ (ヒント: $\mathbb{E}[X_1] = \lambda$)
- (2) $\bar{X}_n$ の分散を求めよ (ヒント: $\mathbb{E}[X_1(X_1 - 1)] = \lambda^2$)
- (3) $\mathbb{E}[\{(\partial/\partial\lambda) \log f_X(x|\lambda)\}^2]$ を求め, λ の不偏推定量の分散の下限を求めよ (ヒント: クラメル・ラオの下限は $1/(n\mathbb{E}[\{(\partial/\partial\lambda) \log f_X(x|\lambda)\}^2])$ である.)
- (4) λ の一様最小分散不偏推定量を求めよ.