

# 確率統計と情報処理・演習（2006年度後期）

## 1 変量データ分析

2006年10月06日

日本女子大学理学部数物科学科

今野 良彦

October 3, 2006

## 今日の講義の目的と概要

### 目的

- (1) データが入力されたら, とりあえずデータにどんな値がどれくらいあるかを調べる. この様子をあらわしたものを「分布」という. 表現法として, 度数分布表や図(ヒストグラム)がある.
- (2) 分布を説明するために, 分布の中央あたりの値を「分布の中心」として「分布の代表値」とする.
- (3) つぎに, データのばらつきを表現する尺度を議論する.

## 今日の講義の目的と概要

### 目的

- (1) データが入力されたら, とりあえずデータにどんな値がどれくらいいるかを調べる. この様子をあらわしたものを「分布」という. 表現法として, 度数分布表や図(ヒストグラム)がある.
- (2) 分布を説明するために, 分布の中央あたりの値を「分布の中心」として「分布の代表値」とする. — 平均値と中央値. さらに, 最小値と最大値, ボックスプロット(箱ひげ図)
- (3) つぎに, データのばらつきを表現する尺度を議論する .. — 分散と標準偏差, 平均偏差, 範囲, 四分位偏差

## ヒストグラム

- 単峰型
  - 峰を中心に左右対称のもの
  - 左に偏ったもの(下段左) — 山の裾の部分に注目している!
  - 右に偏ったもの(下段右)
- 双峰型・多峰型 — 異種のデータが混在している場合が多い.

## ヒストグラムの作成

### ヒストグラムの作成

```
> a<-rnorm(100,10,10)
> hist(a)
> a<-round(rnorm(50,10,20))
> a
[1] -1 39 -4 -13 -2 40 -17 1 20 14
[11] 3 27 6 47 47 -23 6 -8 -5 16
[21] -17 -5 15 6 0 0 33 -16 23 -39
[31] 29 22 7 -10 26 16 -10 13 -1 -1
[41] 42 -23 -4 9 18 -34 14 13 -4 0
> hist(a)
```




Figure 1: 作成されたヒストグラム

## ヒストグラムの作成

```
>  
> # コマンド hist のオプションを調べる  
> ?hist  
> # 割合で表示  
> hist(a,freq=F)  
>
```




Figure 2: 作成されたヒストグラム

## 問題 1

- 以下のようにデータを発生させ，そのヒストグラムを作成し，そこからわかることを述べよ．

### ヒストグラムの作成

```
>  
>  
> a1<-round(rnorm(500,0,1))*5+あなたの誕生日  
>  
> a2<-round(rt(50,10)*5)+あなたの誕生日  
>
```

オブジェクト a1 と a2 のヒストグラムを作成し，それを pdf file で保存する．ファイル名は 学籍番号下3桁-a1.pdf と 学籍番号下3桁-a2.pdf とせよ．さらに，ファイル ローマ字の名前-締め切り.txt

(例：mejiro-hanako-061012.txt)

締め切り：2006年10月13日(金)13時

## 代表値 — 平均値と中央値

$n$  個のデータの値を

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

とする .

平均値

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

中央値

$x_1, x_2, \dots, x_n$  を昇順に並び替えたものを  $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$  としたとき ,

$$Me = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{ が奇数} \\ \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2)+1}}{2} & n \text{ が偶数} \end{cases}$$

たとえば,  $x_1 = 20, x_2 = 10, x_3 = 0$  のとき,

$$x_{(1)} = 0, x_{(2)} = 10, x_{(3)} = 20$$

となる. したがって,  $n = 3$  は奇数だから

$$Me = x_{(2)} = 10$$

また, たとえば,  $x_1 = 20, x_2 = 10, x_3 = 0, x_4 = 30$  のとき,

$$x_{(1)} = 0, x_{(2)} = 10, x_{(3)} = 20, x_{(4)} = 30$$

となる. したがって,  $n = 4$  は偶数だから

$$Me = \frac{x_{(2)} + x_{(3)}}{2} = \frac{10 + 20}{2} = 15$$

## 平均値の意味

$g(a) := \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$  とおく . このとき ,  $g(a)$  を最小にする  $a$  の値は何か ?

$$\begin{aligned} g(a) &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n + \bar{x}_n - a)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + \sum_{i=1}^n (\bar{x}_n - a)^2 - 2(a - \bar{x}_n) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 + \sum_{i=1}^n (\bar{x}_n - a)^2 \geq \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2 \end{aligned}$$

よって ,  $a = \bar{x}_n$  で最小 .

## 絶対偏差

では,

$$f(a) := \sum_{i=1}^n |x_i - a|$$

とおく. このとき,  $f(a)$  を最小にする  $a$  の値は統計的意味をもつか?

すわなち, 分布の位置を表す代表値として用いることができるか?

答えは Yes! しかし, 明示的な表現はできない!

## 平均値と中央値の違い

- ★ 平均値と中央値が近い場合 → 概ねその値を中心として左右対称であることが多い。
- ★ 平均値と中央値が離れている場合 → 対称性が崩れて右ないし左に歪んでいるか、離れた「外れ値」があることがおおい。

注意：ヒストグラムなどで確認できること！

垂水共之・飯塚誠也 著「R/S-PLUSによる統計解析入門」(共立出版, 2006年4月25日のサポートのページ

<http://www.mikawayaya.to/appstat/>

の `boxplot_interactive.r` を使い説明せよ！

$n$  個のデータの値を

## 最大値と最小値

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

としたとき,

$x_{(1)}$  : 最小値,       $x_{(n)}$  : 最大値

### 最大値と最小値

```
> height
[1] 166 154 165 169 155 158 168 154 162 153
> min(height)
[1] 153
> max(height)
[1] 169
>
```

## 箱ひげ図 (ボックスプロット)

もとのデータ  $x_1, x_2, \dots, x_n$  を並び替えたものを

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$$

とする .

- 第 1 四分位点 — データの下から  $n/4$  個の値
- 中央値 (第 2 四分位点) — データの下から  $n/2$  個の値
- 第 3 四分位点 — データの下から  $3n/4$  個の値

## summary と boxplot.stats

```
> x<-1:12
> summary(x)
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 1.00  3.75   6.50   6.50  9.25  12.00
>
#
> boxplot.stats(x)
$stats
[1] 1.0 3.5 6.5 9.5 12.0
$n
[1] 12
$conf
[1] 3.76336 9.23664
$out
numeric(0)
# stats のみを出力
> boxplot.stats(x)$stats
[1] 1.0 3.5 6.5 9.5 12.0
> boxplot.stats$conf
NULL
> boxplot.stats(x)$conf
[1] 3.76336 9.23664
```

boxplot : 箱ひげ図の出力

```
> x<-1:12  
> boxplot(x)  
>
```




Figure 3: 箱ひげ図

## ばらつきの尺度：分散と標準偏差

### 2つのデータの比較

```
> height
[1] 148 160 159 153 151 140 156 137 149 160 151 157 157 144
> height2
[1] 138 162 158 151 145 134 160 137 151 163 152 163 158 147
> mean(height)
[1] 151.5714
> mean(height2)
[1] 151.3571
> median(height)
[1] 152
> median(height2)
[1] 151.5
> boxplot(height,height2,names=c("height","height2"))
```




Figure 4: 2つの箱ひげ図

代表値(分布の位置)は似ているが, 値のばらつき具合が違う!

- 範囲 — `diff(range(x))`

$$x_{(n)} - x_{(1)}$$

- 四分位範囲 — `diff(quantile(x,c(0.25,0.75),names=F))`

$$x_{(3n/4)} - x_{(n/4)}$$

- 平均偏差 — `sum(abs(x-mean(x)))/length(x)`

$$(1/n) \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}_n|$$

- 分散 — `var(x)` または

```
sum((x-mean(x))^2)/(length(x)-1)
```

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2}{(n - 1)}$$

- 標準偏差 — `sd(x)` または

```
sqrt(sum((x-mean(x))^2)/(length(x)-1))
```

これらの値は大きいほどばらつく！

## 問題 2

co2 と入力すると Mauna Loa Atmospheric での 1959 年から 1997 年までの毎月の CO<sub>2</sub> の濃度のデータが利用できる .

```
> cc<-seq(1,length(co2),by=12)
> cc
 [1] 1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181
[20] 229 241 253 265 277 289 301 313 325 337 349 361 373 385 397 409
[39] 457
> # オブジェクト y にあたる誕生月のデータを入力
> apr<-co2[cc+(あなたの誕生月マイナス1を入力)]
>
> apr<-co2[cc+3]
> apr
 [1] 317.56 318.87 319.31 320.42 321.22 321.40 321.97 323.54 324.25 325.12 326.00 327.00 328.00 329.00 330.00
[12] 327.97 327.62 329.56 331.33 332.48 333.14 334.41 335.90 337.59 339.30 341.00 342.70 344.40 346.10 347.80
[23] 342.33 343.39 344.77 346.88 348.17 349.37 350.80 353.41 355.26 357.00 358.70 360.40 362.10 363.80 365.50
[34] 359.07 359.41 361.25 363.48 364.76 366.40
>
```

- (1) 誕生月のデータの平均と中央値を求めよ .
- (2) 箱ひげ図を作成せよ .
- (3) 範囲 , 四分位偏差 , 平均偏差 , 分散 , 標準偏差を求めよ .

テキストファイルに実行文と結果を貼り付け , 箱ひげ図は pdf file ( 学籍番号  
下3桁-boxplot.pdf ) で添付すること .

締め切り : 2006 年 10 月 13 日 ( 金 ) 13 時